



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Facultad de
ENFERMERÍA

EVIDENCIAS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE
ADULTO POSOPERADO DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN LA
UNIDAD DE RECUPERACIÓN POSTANESTÉSICA

EVIDENCE OF NURSING CARE IN THE ADULT PATIENT POST-
OPERATED WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN THE POST-
ANESTHETIC RECOVERY UNIT

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CENTRO
QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO

AUTORA

ANGIE ESTEFANIA LISMA GARCIA

ASESOR

HUGO ROLANDO CAMPOS CORONEL

LIMA-PERÚ

2024

ASESOR DE TRABAJO ACADÉMICO

ASESOR

Magister. Hugo Rolando Campos Coronel

Departamento Académico de Investigación

ORCID:0000-0002-7519-8520

DEDICATORIA:

A Dios, a mi madre y familia, por su compañía y apoyo incondicional en el transcurso de mi vida, fueron ellos quienes estuvieron presente en mi mente y en cada paso que di.

AGRADECIMIENTO:

A mi Asesor por su tiempo y delicadez, por brindar sus enseñanzas en el transcurso del trabajo monográfico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Trabajo autofinanciado.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

El presente trabajo académico declara no tener conflicto de interés

RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD

EVIDENCIAS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE ADULTO POSOPERADO DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN POSTANESTÉSICA

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%

INDICE DE SIMILITUD

19%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.upch.edu.pe

Fuente de Internet

7%

2

livrosdeamor.com.br

Fuente de Internet

2%

3

eugenioespejo.unach.edu.ec

Fuente de Internet

2%

4

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

2%

5

renati.sunedu.gob.pe

Fuente de Internet

1%

6

Submitted to National University College - Online

Trabajo del estudiante

1%

7

repositorio.uigv.edu.pe

Fuente de Internet

1%

es.slideshare.net

Tabla de contenidos

<u>I. INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>II. CUERPO</u>	5
- <u>Metodología</u>	5
- <u>Selección del tema</u>	5
- <u>Búsqueda</u>	6
- <u>Resultados</u>	6
- <u>Análisis e interpretación</u>	10
<u>III. CONCLUSIÓN</u>	11
<u>IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	13

Anexos

RESUMEN

El presente trabajo monográfico se enfoca en la revisión de artículos científicos de los últimos 5 años respecto al cuidado de enfermería en pacientes adultos posoperados de colecistectomía laparoscópica en el área de recuperación posanestésica. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general y requiere menos tiempo de hospitalización en comparación con la cirugía convencional, minimizando más del 70% de riesgos y solo se indica que el 14.90% de casos presentan complicaciones

Objetivo: Describir los cuidados de enfermería según las evidencias científicas en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica en la unidad de recuperación posanestésica. **Metodología:** El presente trabajo es un diseño de revisión documental, de tipo retrospectivo; resulta de la investigación de múltiples fuentes bibliográficas. **Resultado:** Evidenciando el notable papel del cuidado de los profesionales de enfermería en la recuperación total y satisfactoria de los pacientes posoperados, se logró identificar los siguientes cuidados inmediatos de enfermería, dividiéndose según dimensiones en los cuidados brindados en el Sistema neurológico, Sistema cardiovascular, Sistema gastrointestinal, Sistema renal, Sistema tegumentario, Sistema musculoesquelético y el Estado emocional. **Conclusión:** Una vez identificados las intervenciones de enfermería, se puede realizar un plan de cuidado oportuno en cada sistema, facilitando así el buen cuidado de calidad al paciente, con el fin de prevenir posibles complicaciones posoperatorias.

Palabras claves: “cuidado de enfermería” y “adulto posoperado”, “colecistectomía laparoscópica” y “paciente adulto”, “cuidado de enfermería” y “colecistectomía laparoscópica”

ABSTRACT

The present monographic work focuses on the review of scientific articles from the last 5 years regarding nursing care in adult patients after laparoscopic cholecystectomy in the area of post-anesthesia recovery. This procedure is performed under general anesthesia and requires less hospitalization time compared to conventional surgery, minimizing more than 70% of risks and only 14.90% of cases are indicated to present complications.

Objective: To describe nursing care according to scientific evidence in the adult patient after laparoscopic cholecystectomy in the post-anesthesia recovery unit. **Methodology:** This work is a retrospective documentary review design; It results from the investigation of multiple bibliographic sources. **Result:** Demonstrating the notable role of the care of nursing professionals in the total and satisfactory recovery of postoperative patients, it was possible to identify the following immediate nursing care, dividing according to dimensions in the care provided in the neurological system, cardiovascular system, gastrointestinal system, renal system, integumentary system, musculoskeletal system and emotional state. **Conclusion:** Once the nursing interventions have been identified, a timely care plan can be made in each system, thus facilitating good quality care for the patient, in order to prevent possible postoperative complications.

Keywords: “nursing care” and “postoperative adult”, “laparoscopic cholecystectomy” and “adult patient”, “nursing care” and “laparoscopy cholecystectomy”

I. INTRODUCCIÓN

La colecistectomía laparoscópica, es un procedimiento quirúrgico utilizado para extirpar la vesícula biliar. Esta intervención quirúrgica se utiliza para tratar la vesícula biliar inflamada o con cálculos biliares, los cuales pueden causar dolor abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas.(1) Se realiza bajo anestesia general y requiere menos tiempo de hospitalización en comparación con la cirugía convencional, minimizando más del 70% de riesgos y solo se indica que el 14.90% de casos presentan complicaciones,(2). Entre otras complicaciones se observa las lesiones en la vía biliar, en el cual se identificó que hay una tasa entre el 0,74% y el 2,8% que presentaron algunos pacientes. Sin embargo, con el tiempo, esta tasa se estabilizó en un nuevo rango de aproximadamente el 0,4% al 0,5%, haciendo que la colecistectomía laparoscópica se considere como el procedimiento quirúrgico más común y menos invasivo realizado por los cirujanos generales.(3)

Sin embargo, también se pueden presentar otras complicaciones quirúrgicas, como la fuga de bilis de Luschka que ocurre en 0,1% a 0,5% de los pacientes incluyendo, peritonitis (0,2%), sangrado en el sitio quirúrgico, hematomas, formación de adherencias y lesiones neurológicas por la mala posición del paciente durante la cirugía. Aunque, cabe destacar que la cirugía laparoscópica al ser menos invasiva que otros procedimientos quirúrgicos, las complicaciones que pueden surgir tienden a ser menos graves y frecuentes.(4)

A nivel nacional, un estudio realizado en Lima pudo identificar que el 72.17% de los pacientes percibían la calidad del cuidado de enfermería como adecuada, además de

cumplir con los protocolos adecuados, brindando atención directa y continua a los pacientes, por lo que su competencia y habilidades son fundamentales para asegurar una atención de calidad.

Es por ello, que para un adecuado cuidado de enfermería en pacientes posoperados es necesario la implementación de métricas e indicadores que posibiliten la estimación de resultados; además, del compromiso e involucramiento del personal de salud en el proceso de mejora continua; asimismo, la inversión de parte de los centros hospitalarios en el desarrollo y capacitación que se le brinde a los miembros del equipo de salud; por último, la adquisición de innovación en los procesos de cuidado. (5)

Frente a estos hallazgos, se consideró realizar el siguiente tema de investigación: planteando la siguiente pregunta de estudio: ¿Cuál es el cuidado de enfermería al paciente post operado de colecistectomía laparoscópica en el área de recuperación posanestésica?

Esta investigación se realiza debido a las diversas complicaciones ya sean moderadas o severas que se pueden presentar por parte de este procedimiento quirúrgico; Por lo tanto, es importante que el enfermero brinde un cuidado de calidad, seguridad y confort, conocer cuáles son las intervenciones inmediatas que brinda el personal de enfermería a estos pacientes posoperados colecistectomía laparoscópica en el área de recuperación posanestésica.

El bloque quirúrgico, es un área de un hospital o clínica diseñada específicamente para la realizar procedimientos quirúrgicos, generalmente consta de múltiples salas de

operaciones, así como áreas de preparación y recuperación de pacientes. Está equipado con tecnología médica especializada, como sistemas de anestesia, monitores, iluminación y equipo quirúrgicos necesario.(6)

La recuperación de la anestesia es un proceso peligroso, muchos problemas relacionados con la anestesia y la cirugía pueden ocurrir en el postoperatorio inmediato, por lo que es muy importante continuar con los cuidados adecuados oportunos durante este período evaluando dentro de las alteraciones más frecuentes durante el postoperatorio inmediato.(7)

En el período postquirúrgico inmediato, es decir en las primeras horas siguientes a la intervención, el profesional de enfermería debe estar presente en la sala de recuperación y realizar las siguientes actividades: Monitorear constantemente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y otros signos vitales para detectar cualquier alteración y proporcionar intervenciones adecuadas. Por otro lado, en el periodo mediano que se da durante la salida del área de recuperación a hospitalización, el papel del profesional de enfermería tiene que continuar con la monitorización del paciente, una adecuada administración de medicamentos, cuidado de herida operatoria, manejo de drenajes y sondas, educación al paciente y su familia, y brindar apoyo emocional durante este período crucial.(8)

OBJETIVOS

Objetivo general

- Describir los cuidados de enfermería según la evidencia científica en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica en la unidad de recuperación posanestésica.

Objetivos específicos

- Identificar los cuidados inmediatos de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica en la unidad de recuperación posanestésica.
- Caracterizar los cuidados inmediatos de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica en la unidad de recuperación posanestésica.

II. CUERPO

- Metodología

El presente trabajo es un diseño de revisión documental, de tipo retrospectivo; resulta de la investigación de múltiples fuentes bibliográficas; se analiza diversas revistas científicas de salud tanto a nivel internacional, nacional, el cual consiste en condensar y comparar resultado de diversas investigaciones en el campo profesión al del cuidado de enfermería.

- Selección del tema

El tema de estudio sobre las evidencias del cuidado de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía, se seleccionó debido a que es un procedimiento quirúrgico muy utilizado hoy en día por la medicina y trae mayores beneficios y ventajas en la recuperación de los pacientes.

Además, se extrajeron publicaciones con los siguientes criterios de inclusión: artículos que aborden cuidado de enfermería en pacientes adultos, además de pacientes que están posoperados de colecistectomía, realizados en países extranjeros, en los idiomas español, portugués, revistas indexadas, de texto completo y publicaciones de los últimos 5 años comprendidos entre los años 2019 al 2023.

Los criterios de exclusión fueron: artículos con limitación en el acceso, artículos de resumen, artículos que no se evidencian cuidado de enfermería en el paciente adulto, investigaciones que no se encuentran indexadas en una base de datos confiable.

- **Búsqueda**

A continuación, se presenta la caracterización de los artículos revisados en un total de 3200; de los cuales se redujeron, primero por el título, luego el resumen y finalmente la lectura del texto completo.

La búsqueda de información se realizó en diferentes bases de datos electrónicas, tales como Redalyc, Google Académico, Pubmed, Portal Regional de la BVS, Scielo, Portales académicos, Sobecc. La investigación fue realizada usando los operadores booleanos AND y OR, se utilizaron las siguientes palabras (Descs) “cuidado de enfermería” and “adulto posoperado”, “colecistectomía laparoscópica” and “paciente adulto”, “cuidado de enfermería” and “colecistectomía laparoscópica”. “nursing care” and “laparoscopy cholecystectomy” En dicha búsqueda se encontraron y se seleccionaron 22 artículos de investigación.

- **Resultados**

De las evidencias científicas disponibles del cuidado de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica, se presenta la siguiente caracterización de los artículos revisados.

En la Tabla N° 1, se observa la distribución de los artículos científicos en las diferentes bases de datos consultadas; siendo el mayor número de publicaciones encontradas en la base de datos de Google académico (n=10), seguido de Pubmed (n=8), SciELO (n=4), (Tabla 1, ver anexos)

Con relación a la tabla N° 2, se extrajeron artículos que aborden entre los años 2019 al 2023, observando una mayor frecuencia de estudios publicados en el año 2022 (n=7), en el 2021 (n=9), 2020 (n=2), 2019 (n=2), 2018 (n=2), reflejando así que las bases de datos científicas relacionadas al tema de estudio, se encuentran respaldadas por publicaciones en los últimos 5 años (Tabla 2, ver anexos).

La enfermería desempeña un papel fundamental en la identificación temprana de las complicaciones postoperatorias, según la información obtenida de diversas literaturas científicas del cuidado enfermero a pacientes posoperados, se logró identificar los siguientes cuidados inmediatos de enfermería, dividiéndose en los cuidados del Sistema neurológico, Sistema cardiovascular, Sistema gastrointestinal, Sistema renal, Sistema tegumentario, Sistema musculoesquelético y el Estado emocional.

Según la evidencia científica de un estudio realizado en los países de Ecuador y México acerca de los cuidados de enfermería durante el posoperatorio inmediato, estos cuidados se agrupan en dimensiones previamente estudiadas para prevenir complicaciones y promover una pronta recuperación.

Respecto a los cuidados del Sistema Neurológico, se debe describir la actividad donde el personal de enfermería valora el dolor empleando la Escala Visual Analógica (EVA), donde el enfermero hace preguntas al paciente con ayuda de una tarjeta visual indicando que número en la escala de dolor presenta; también evalúa la capacidad del paciente por conciliar el sueño teniendo en cuenta que el enfermero debe tener un amplio conocimiento del sueño y sus principios influyendo en el reposo que requiere el paciente.

De los cuidados dentro del Sistema Cardiovascular, podemos decir que el enfermero debe monitorizar las constantes vitales como son la Presión Arterial, vigilando que el nivel de la PAM se encuentre dentro de los parámetros normales, otras constantes vitales como es la frecuencia cardiaca, estos cuidados se brindan para prevenir posibles complicaciones como la hipotensión, que se da por el descenso de la presión arterial posiblemente debido a los efectos posanestésicos, además el paciente puede presentar, arritmias estas pueden ser detectadas por medio de un monitor cardiográfico o realizando un electrocardiograma, se comunicara al médico Anestesiólogo de turno indicando cualquier incurrancia.

Dentro de los cuidados en el Sistema Respiratorio, se verifica permeabilidad aérea, se administra oxigenoterapia ya sea por algún dispositivo como es la cánula binasal o mascara de reservorio previa evaluación de necesidad del fio2 y valoración de la frecuencia respiratoria, la colocación correcta de pulsioxímetro ya que es un indicador importante para una correcta lectura de ingreso de oxígeno al paciente, se supervisa también la profundidad de la respiración.

Evaluando los cuidados del enfermero en el Sistema Gastrointestinal, el personal de enfermería evalúa la presencia de nauseas o vómitos que se puedan presentar mayormente por efectos secundarios del tipo de anestesia y fármacos utilizados en sala de operaciones, se realiza la valoración de signos de distensión abdominal y ruidos hidroaéreos por medio de la percusión; se evalúa drenajes quirúrgicos, sondas y ostomías, el enfermero debe estar capacitado y ser conocedor de procedimientos

invasivos como son estos, y manejar correctamente los dispositivos médicos, evaluando así la cantidad de drenaje y sus características.

De los cuidados del Sistema Renal, se realiza una evaluación oportuna de deshidratación y funcionalidad la sonda vesical si sea el caso, se describe las características y el volumen de la orina, también de debe identificar signos de edema, así como el control de ingresos y egresos del paciente mediante un balance hídrico estricto.

Se puede describir dentro de los cuidados utilizados en el Sistema Tegumentario, el enfermero debe evaluar el estado de la piel, realizando una inspección cefalo-caudal, se inspecciona contantemente el estado de la herida operatoria y la presencia de humedad de los apósitos, también se verifica contantemente control de temperatura de la piel con ayuda del control de monitorización.

Del Sistema Musculo esquelético se evidencian cuidados como es, la evaluación al paciente mediante escalas específicas como la de Northon y Branden, donde se evalúa la integridad cutánea en pacientes con lesiones por presión; así como la valoración del grado de dependencia por medio de la escala de Barthel, y la valoración de riesgo de caídas por medio de la escala de Dowton.

El enfoque cultural del cuidado que brinda el enfermero en esta dimensión como es el Estado Emocional, inicialmente se debe identificar correctamente al paciente ya sea por indicadores como la historia clínica, brazaletes de identificación, presentarse ante el paciente para afianzar seguridad y brindar empatía, realizar un proceso de atención de

enfermería donde identifiquemos los datos subjetivos del paciente, ya que este en muchos casos les cuesta adaptarse a un nuevo ambiente recordando que cada persona puede experimentar diversas situaciones. (9)(10)

- **Análisis e interpretación**

De acuerdo con los 22 artículos evidenciados en la literatura científica, se puede señalar que los cuidados que brinda el profesional de enfermería en pacientes posoperados de colecistectomía laparoscópica en la unidad de recuperación posanestésica; muchos de estos guardan similitud. Además, se evidencia que para que se brinde un adecuado cuidado, existe la aplicación de protocolos específicos en cada institución, estos deben ser cumplidos a cabalidad, brindando un cuidado de calidad, holístico, y humanizado.

Además cabe señalar que según la evidencia científica a nivel internacional y a nivel nacional, se han encontrado que debido a las diferencias en las políticas de salud como es en el estado privado y nacional; Se logran identificar por la literatura científica con ayuda de enfermeras de diferentes países de América, agrupándolos en 8 dimensiones del cuidado enfermero; además cuentan con mayor innovación en tecnología y equipo de personal capacitado en el cuidado enfermero quirúrgico, estos pues llegan a contemplar una estadía hospitalaria más corta, producto a que este procedimiento es mínimamente invasivo, posibilita la alta hospitalaria el mismo día de la intervención quirúrgica, después de una buena valoración cirujano y enfermero quirúrgico.

III. CONCLUSIÓN

Después del análisis sistematizado de los artículos de investigación se puede concluir:

- A través de las evidencias científicas disponibles acerca de los cuidados de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica en el área de recuperación posanestésica, este juega un papel fundamental en el proceso de la recuperación óptima de estos pacientes. Las evidencias científicas respaldan la importancia de las intervenciones de enfermería, agrupando los cuidados inmediatos a partir de las experiencias durante las intervenciones realizadas según la necesidad de los pacientes, lo que reafirma la necesidad de brindar cuidados de enfermería en 8 dimensiones.
- Con respecto a la identificación de los cuidados inmediatos de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica, se observó que la actuación de enfermería en las dimensiones estudiadas como son los cuidados en el sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema renal, sistema tegumentario, sistema musculoesquelético y el estado emocional, son óptimos para prevenir posibles complicaciones y una estadía prolongada en la hospitalización.
- Por último, con respecto a la caracterización de los cuidados inmediatos de enfermería en el paciente adulto posoperado de colecistectomía laparoscópica, se puede concluir que, una vez identificados las intervenciones de enfermería, se puede realizar un plan de cuidado oportuno en cada sistema, facilitando así el buen cuidado al paciente, satisfaciendo cada necesidad asegurando una pronta recuperación

posoperatoria y que el paciente se sienta seguro por los cuidados brindados en el área de recuperación posanestésica.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cevallos Alvarado, M. A., Farías Mendoza, J. J., Santos Zambrano, C. J., & Vélez Daza, G. C. (2021). Factores de riesgo en cirugía laparoscópica. *RECIMUNDO*, 5(2), 230–237. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(2\).abril.2021.230-237](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(2).abril.2021.230-237)
2. Chekol, B., Eshetie, D., & Temesgen, N. (2021). *Assessment of Staffing and Service Provision in the Post-Anesthesia Care Unit of Hospitals Found in Amhara Regional State, 2020*. <https://doi.org/10.2147/DHPS.S302303>
3. Eugenio Espejo, R., Dávila, V., Fernanda, M., Ceh, G., Guadalupe, J., Balseca, A., Lorena, S., Rendón, C., & Milisen Joset, M. (n.d.). *Cuidado de enfermería durante el postoperatorio inmediato*. <https://doi.org/10.37135/ee.04.11.04>
4. *Lesiones iatrogénicas de las vías biliares*. (n.d.). Retrieved January 17, 2024, from http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292017000400010
5. Nacional De Lima, H., Ramos, L. C., Matilde, J., Sancho, C., & Lozano, A. M. (n.d.). *Artículo original Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes posoperados en un Nursing Care Quality as Perceived by Postoperative Patients from a National Hospital in Lima, Peru*. <https://orcid.org/0000-0003-4654-724X>
6. *Vista de Colecistitis aguda tratamiento por laparoscopia y cuidados de enfermería post quirúrgicos*. (n.d.). Retrieved January 17, 2024, from <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1835/2188>

7. *Vista de Factores de riesgo en cirugía laparoscópica.* (n.d.).

Retrieved January 17, 2024, from

<https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1073/1718>

ANEXOS

Tabla 1. Distribución de los artículos científicos por bases de datos

<i>Base de datos</i>	Frecuencia
<i>Google académico</i>	10
<i>Pubmed</i>	8
<i>SciElo</i>	4
<i>Total</i>	22

Tabla 2. Distribución de los artículos según el año

<i>Año</i>	Frecuencia
2022	7
2021	9
2020	2
2019	2
2018	2
<i>Total</i>	22

Tabla 3. Distribución de los artículos según metodología

Año	Frecuencia
<i>Cuantitativa</i>	15
<i>Revisión bibliográfica</i>	7
<i>Total</i>	22

Tabla 4. de Resultados: se evidencia que los países de América como, Ecuador, México, Costa Rica brindan cuidados humanizados según las siguientes dimensiones

Cuidado de enfermería a durante el postoperatorio inmediato	Sistema Neurológico	Se debe describir la actividad donde el personal de enfermería valora el dolor empleando la Escala Visual Analógica (EVA),
		Evalúa la capacidad del paciente por conciliar el sueño teniendo en cuenta que el enfermero debe tener un amplio conocimiento del sueño y sus principios influyendo en el reposo que requiere el paciente.
	Sistema Cardiovascular	Podemos decir que el enfermero debe monitorizar las constantes vitales como son

	<p>la Presión Arterial, PAM, frecuencia cardiaca,</p> <p>Además, el paciente puede presentar, arritmias estas pueden ser detectadas por medio de un monitor cardiográfico</p>
Sistema Respiratorio	Se verifica permeabilidad aérea, se administra oxigenoterapia.
Sistema Gastrointestinal	<p>El personal de enfermería evalúa la presencia de nauseas o vómitos.</p> <p>Se realiza la valoración de signos de distensión abdominal y ruidos hidroaéreos</p> <p>Se evalúa drenajes quirúrgicos, sondas y ostomías</p>
Sistema Renal	se realiza una evaluación oportuna de deshidratación y funcionalidad la sonda vesical si sea el caso, se describe las características y el volumen de la orina, también de debe identificar signos de edema, así como el control de ingresos y egresos del paciente mediante un balance hídrico estricto.

Sistema Tegumentario	<p>el enfermero debe evaluar el estado de la piel, realizando una inspección céfalo-caudal, se inspecciona contantemente el estado de la herida operatoria y la presencia de humedad de los apósitos, también se verifica contantemente control de temperatura de la piel con ayuda del control de monitorización.</p>
Sistema Musculoesquelético	<p>Se evidencian cuidados como es, la evaluación al paciente mediante escalas específicas como la de Northon y Branden, donde se evalúa la integridad cutánea en pacientes con lesiones por presión; así como la valoración del grado de dependencia por medio de la escala de Barthel, y la valoración de riesgo de caídas por medio de la escala de Dowton.</p>
Estado Emocional	<p>Se debe identificar correctamente al paciente ya sea por indicadores como la historia clínica, brazalete de identificación,</p>

	presentarse ante el paciente para afianzar seguridad y brindar empatía.
--	---

- FICHAS RAE

Tabla 5. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°1

Título	Percepción de los cuidados de enfermería del paciente adulto postquirúrgico en colecistectomía
Autores	Torres, X; Guzmán, S; Pallango, B; Chicaiza, A; Guangasi, J
Año	2022
Objetivo	Describir la percepción de los cuidados de Enfermería del paciente adulto postquirúrgico en Colecistectomía, mediante una revisión sistémica de la bibliografía.
Metodología	Revisión sistémica de la literatura, metodología descriptiva
Resultados	Se seleccionaron 12 publicaciones acomodadas a las palabras clave de búsqueda y criterios de inclusión y exclusión considerados para su selección.
Conclusión	Es indudable que la percepción del cuidado de enfermería es fundamental para proveer un cuidado holístico y con ello una pronta recuperación del paciente; a través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, estas actividades logran mayor rentabilidad

	para la gestión hospitalaria; con respecto a la percepción del paciente hay mayor satisfacción y menos días de hospitalización
--	--

Tabla 6. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°2

Título	Efecto de la enfermería de confort sobre la calidad de vida posoperatoria, las emociones negativas y la satisfacción de enfermería en pacientes sometidos a cirugía laparoscópica
Autores	Yuan Gao , Jing Huang , Yan Zheng, Jiacen Han.
Año	2021
Objetivo	Este estudio tuvo como objetivo explorar los impactos de la enfermería de confort en la calidad de vida posoperatoria, las emociones negativas y la satisfacción de la enfermería de pacientes sometidos a cirugía laparoscópica.
Metodología	Se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospectivo
Resultados	El grupo de investigación experimentó notablemente más temprano el primer tiempo de ingesta de alimentos, el primer tiempo de defecación, el primer tiempo de deambulación, el primer tiempo de escape anal y el tiempo de recuperación del gorgoteo, y una estancia hospitalaria considerablemente más corta. menor incidencia de complicaciones postoperatorias y puntuación en la Escala Visual Analógica a las 12 h de la cirugía, y evidentemente mayores puntuaciones de calidad de

	<p>vida y satisfacción de enfermería. Además, las puntuaciones de la Escala de autoevaluación de la depresión y la Escala de autoevaluación de la ansiedad del grupo de investigación fueron significativamente más bajas que las del grupo de control.</p>
Conclusión	<p>Para los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica, la enfermería reconfortante puede aliviar sus emociones negativas, mejorar su calidad de vida y la satisfacción de la enfermería, reducir el dolor posoperatorio y así promover la rehabilitación posoperatoria. Por tanto, es digno de promoción clínica.</p>

Tabla 7. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°3

Título	Actuación del personal de enfermería en intervenciones quirúrgicas laparoscópicas
Autores	Roberto Carlos Torres Cruz, Nelly Hiralda Tapia Tapia, Verónica Paulina Herrera Calderón, Martha Lucia Guallichico Maura, Blanca Ofelia Pallango Espin
Año	Roberto Carlos Torres Cruz, Nelly Hiralda Tapia Tapia, Verónica Paulina Herrera Calderón, Martha Lucia Guallichico Maura, Blanca Ofelia Pallango Espin.
Objetivo	Identificar la actuación del personal de enfermería en intervenciones quirúrgicas laparoscópicas.

Metodología	Se realizó una revisión sistemática, tipo cualitativo
Resultados	Los beneficios, complicaciones y la actuación de enfermería en procesos laparoscópicos teniendo en cuenta que este tipo de procedimiento es una de las mejores opciones al momento de realizar una intervención quirúrgica.
Conclusión	Los procedimientos laparoscópicos a comparación de la laparotomía presentan ventajas para el paciente, el personal de enfermería bien entrenado tiene la capacidad de que el procedimiento tenga un menor tiempo quirúrgico gracias a su eficiente actuar, con su pensamiento crítico es capaz de desenvolverse con rapidez ante situaciones de riesgo preservando la calma, concentración y la capacidad de afrontar tales situaciones en la sala de cirugía.

Tabla 8. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°4

Título	Validación de intervenciones enfermeras en el postoperatorio de cirugías laparoscópicas no complicadas en el Hospital Universitario de Canarias.
Autores	María de la O Álvaro Afonso, Francisco Martín Rodríguez Solís, Mercedes Rodríguez Novo, José Ángel Rodríguez Gómez Mercedes Rodríguez Novo
Año	2019

Objetivo	clasificar los pacientes atendidos en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) de cirugías laparoscópicas no complicadas realizadas por el Servicio de Cirugía General y Digestiva
Metodología	Estudio observacional descriptivo retrospectivo para determinar y validar las Intervenciones Enfermeras normalizadas más frecuentes.
Resultados	Se identificó el GDR 494 como el más frecuente de las cirugías laparoscópicas de CGD del HUC (27,25%). Se validaron clínicamente 12 intervenciones enfermeras propuestas en el proyecto NIPE para el GDR 494, de las cuales 5 fueron seleccionadas con frecuencia muy alta (>50%). Se proponen 9 intervenciones enfermeras, seleccionadas en alta y muy alta frecuencia, para ser incluidas en los modelos teóricos. Se validaron las actividades propuestas para la intervención enfermera “1400 Manejo del Dolor”.
Conclusión	Se observa que más del 60% de las intervenciones propuestas en el proyecto NIPE para el GDR 494 no fueron seleccionadas. Se propone revisar y actualizar las intervenciones enfermeras teorizadas en base a los avances científicos y los cambios taxonómicos cada 5 años

Tabla 9. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°5

Título	Colecistitis aguda tratamiento por laparoscopia y cuidados de enfermería post quirúrgicos
Autores	Efrain Gabriel Suárez Concha, Katty Magdalena Barahona Ochoa, Jeannette Rosmery Zari Tuapante, Jefferson Geovany Castañeda Fuentes
Año	2022
Objetivo	El objetivo de la siguiente revisión bibliográfica, es brindar una práctica y revisión exhaustiva de los aspectos más importantes de la CAC y sus complicaciones. Adicionalmente, se busca resaltar la evidencia actual y los cuidados post quirúrgicos de abordaje de la enfermedad en aras de mejorar los resultados en los pacientes
Metodología	usó una metodología descriptiva, con un enfoque documental
Resultados	El abordaje por excelencia es la colecistectomía laparoscópica el cual debe realizarse dentro de las primeras 72h, debido a que la cirugía temprana se asocia con mejores resultados. Los agentes antimicrobianos están indicados para pacientes de alto riesgo y especialmente en presencia de necrosis de la vesícula biliar. El uso de antibióticos de amplio espectro y en algunos casos con antifúngicos se relaciona con un mejor pronóstico. Además, los equipos quirúrgicos expertos recomiendan una estrategia emergente de no convertir en abierta, una colecistectomía laparoscópica difícil y realizar una

	colecistectomía subtotal. Adicionalmente, en algunos casos, el uso de la colecistostomía percutánea se recomienda como tratamiento alternativo de emergencia para la colecistitis aguda en pacientes con comorbilidades graves.
Conclusión	En el desarrollo de la investigación se observó una revisión práctica y completa del CAC. La laparoscopia es el primer abordaje sugerido para la colecistectomía y garantiza ventajas significativas sobre la cirugía abierta. En casos seleccionados, la colecistectomía percutánea puede usarse como una maniobra para salvar vidas. Además, se debe tener presente la posibilidad de coledocolitiasis y considerar sus alternativas terapéuticas.

Tabla 10. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°6

Título	Satisfacción de pacientes quirúrgicos con los cuidados de enfermería			
Autores	Glenda Isabel Andrés Alexis Ramírez coronel,	Carina Cristina	Arcentales Mesa Carlos Gafas González	Lema, Cano,
Año	2021			
Objetivo	La satisfacción de los pacientes es un indicador de calidad y bienestar que, a la vez facilita, promueve y garantiza altos niveles de atención			

	<p>en salud, brindados por el personal de enfermería. Objetivo General:</p> <p>Determinar la satisfacción de los pacientes quirúrgicos con los cuidados de enfermería, en el área de cirugía del Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues.</p>
Metodología	<p>Estudio cuantitativo, prospectivo, descriptivo, transversal y no experimental</p>
Resultados	<p>Los resultados revelan que el personal de enfermería brinda una atención de salud óptima donde los pacientes manifiestan sentir satisfechos, sin embargo, se evidencia que hay mayor satisfacción con el cuidado de enfermería en mujeres jóvenes de tercer nivel a diferencias de otro nivel de instrucción.</p>
Conclusión	<p>Respecto a la calidad del cuidado prestado por el equipo de enfermería según la perspectiva del paciente, se pudo concluir que hay no hay un déficit de la calidad de los cuidados de enfermería prestados en la institución, y también un alto nivel de satisfacción de los pacientes con los cuidados de enfermería recibidos, en todas las categorías.</p>

Tabla 11. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°7

Título	Colecistectomía laparoscópica subtotal como alternativa quirúrgica segura en casos complejos
Autores	Jara, G; Rosciano, J; Barrios, W; Vegas, L; Rodríguez, O; Sánchez, R; Sánchez, A
Año	2018
Objetivo	Describir la colecistectomía laparoscópica subtotal como alternativa quirúrgica segura en casos complejos
Metodología	Estudio retrospectivo de pacientes a quienes se les realizó colecistectomía laparoscópica subtotal en un periodo de 8 años.
Resultados	Se realizaron 1.059 colecistectomías laparoscópicas. De estas, 22 correspondieron a colecistectomías subtotales. No se registraron lesiones de vía biliar ni conversiones. Las complicaciones más frecuentes fueron la fístula biliar (9%) y la colección intraabdominal (4,5%). No hubo mortalidad asociada al procedimiento. Durante un periodo de seguimiento promedio de 32 meses, no se observó recurrencia de sintomatología
Conclusión	En el cuidado de pacientes sometidos a cirugía de cálculos biliares, se recomienda promover una intervención de enfermería quirúrgica de recuperación rápida que pueda prevenir eficazmente la aparición de diversas complicaciones postoperatorias y acelerar eficazmente el proceso de recuperación postoperatoria de los pacientes.

Tabla 12. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°8

Título	Factores de riesgo en cirugía laparoscópica
Autores	Cevallos, M; Farías, J; Santos, C; Vélez,
Año	2021
Objetivo	Describir los factores de riesgo en cirugía laparoscópica
Metodología	La metodología de la investigación, es una revisión de tipo bibliográfica, que está apoyada en medios electrónicos como fuente primaria de obtención de la información
Resultados	Los casos consultados en la bibliografía y los aquí resumidos dan cuenta de la baja tasa de complicaciones que estos procedimientos generan, hasta menos del 1% de los casos reportados, lo que indica su confiabilidad y seguridad. Las complicaciones que se pueden presentar son: lesiones vasculares, intestinales, vesicales, lesiones uretrales, hernias, infecciones en heridas quirúrgicas, por nombrar las mas usuales
Conclusión	Los factores de riesgo están asociados a la edad ya que a medida que aumenta la edad, aumentan las patologías y esto representa un factor de riesgo de mortalidad, así como, conversiones intraoperatorias a colecistectomía abierta y complicaciones intra o postoperatorias, tiempo de hospitalización prolongado, así como la cirugía de urgencia constituye un factor de riesgo frente a infección del sitio quirúrgico.

Tabla 13. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°9

Título	Desempeño de las enfermeras respecto al cuidado de Pacientes sometidos a laparoscopia colecistectomía
Autores	Shimaa Asharf Abd Elgilil, Taghreed Talaat*, Bagdad Hussein Mahmoud
Año	2020
Objetivo	Evaluar los conocimientos, prácticas y actitudes de la actuación de los enfermeros en relación al cuidado de los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica
Metodología	Se utilizó un diseño exploratorio descriptivo, donde se analizaron a 50 enfermeras.
Resultados	más de la mitad (56% y 54%) tenían una práctica competente para explicar el procedimiento al paciente y reunir el equipo necesario, reSe halló que más de tres cuartas partes de enfermeros (78%) tenían una práctica incompetente al revisar órdenes médicas para el cuidado de heridas y preparar un área de trabajo estéril y abrir los suministros necesarios. Además, se encontró que más de un tercio (36%) de ellos tenían una práctica total competente en cuanto al vendaje de heridas. Mientras que más de dos tercios (64%) de ellos tenían una práctica total incompetente.
Conclusión	Se encontró deficiencias en el conocimiento y práctica de cuidados adecuados en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica. Por

	tento, se resalta la importancia de que el personal de enfermería de las salas quirúrgicas debe participar en sesiones de capacitación para mejorar sus intervenciones con los pacientes hacia la colecistectomía laparoscópica posoperatoria.
--	--

Tabla 14. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°10

Título	Valor de aplicación de la intervención holística de enfermería en la atención de enfermería de pacientes sometidos a cirugía de colelitiasis
Autores	Meng, F; Zhang, M
Año	2019
Objetivo	Comprender el valor de aplicación de la intervención de enfermería holística en la enfermería de pacientes con cirugía de cálculos biliares.
Metodología	Estudio cuantitativo, transversal
Resultados	La tasa de satisfacción, función física, función social, salud general, comprensión de los elementos de cooperación, tiempo de ejecución, estancia hospitalaria y complicaciones de la cirugía de colelitiasis en el grupo de enfermería holística fueron mejores que en el grupo de control (P <0,05).
Conclusión	El efecto de la intervención de enfermería holística para pacientes con cirugía de cálculos biliares es ideal.

Tabla 15. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°11

Título	Efecto de la atención de enfermería integral de alta calidad sobre las complicaciones posoperatorias, el grado de dolor y la satisfacción de enfermería en pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.
Autores	Wei, L; Hong, Q; Lin, X; Chen, Y; Yang, F; Li, F; Chen, Y
Año	2021
Objetivo	Investigar la influencia de la atención de enfermería integral de alta calidad sobre las complicaciones posoperatorias en pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.
Metodología	Estudio cuantitativo, transversal
Resultados	El número de complicaciones postoperatorias en el grupo experimental fue notablemente menor que en el grupo de control ($P < 0,05$). Después de la intervención, las puntuaciones del grado de dolor en el grupo experimental fueron más bajas que las del grupo de control ($P < 0,05$).
Conclusión	La enfermería integral de alta calidad puede mejorar la incidencia de complicaciones posoperatorias, el grado de dolor, la satisfacción de la enfermería y la calidad de vida de los pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.

Tabla 16. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°12

Título	Cuidado de enfermería durante el postoperatorio inmediato
Autores	María Fernanda Valle Dávila, Jaqueline Guadalupe Guerrero Ceh, Silvia Lorena Acosta Balseca, Maila Milisen Joset Cando Rendón
Año	2021
Objetivo	El objetivo del proceso investigativo fue describir las intervenciones de enfermería durante postoperatorio inmediato y los factores que limitan el cuidado en tres unidades hospitalarias de la provincia Imbabura, Ecuador, durante el primer trimestre del 2020.
Metodología	El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, mediante un estudio no experimental, descriptivo y de corte transversal.
Resultados	El análisis de las limitaciones para el desarrollo de las intervenciones de enfermería en las dimensiones investigadas permitió establecer el predominio de los elementos relacionados con las demandas de los pacientes (48,28%); siendo la falta de tiempo el menos señalado, para un 6,9%
Conclusión	Los resultados permitieron apreciar que la mayoría de los participantes aplicaba <i>siempre</i> los elementos del cuidado de enfermería durante el posoperatorio relacionados con las 8 dimensiones estudiadas. Sin embargo, se debe señalar que sería importante potenciar el uso de herramientas estandarizadas de valoración como las diversas escalas.

Tabla 17. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°13

Título	Colecistectomía laparoscópica durante la pandemia de COVID-19 en un hospital de tercer nivel en Alemania: tasas más altas de colecistitis aguda y gangrenosa en pacientes de edad avanzada
Autores	Mi. Rahimli , C. Wex , F.Wiesmueller , F.Weber , M.Dölling , A. Rose , S. Al-Madhi , M. Andric , R. Croner , y A. Perrakis.
Año	2022
Objetivo	investigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los resultados de las colecistectomías laparoscópicas realizadas en un hospital de atención terciaria en Alemania.
Metodología	Estudio con enfoque cuantitativo
Resultados	Se inscribieron un total de 182 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica durante los períodos mencionados anteriormente. El grupo pandémico estuvo formado por 100 y el grupo control por 82 pacientes. El análisis de subgrupos de pacientes de edad avanzada (> 65 años) reveló tasas significativamente más altas de enfermedades agudas [5 (17,9%) frente a 20 (58,8%); p = 0,001] y colecistitis gangrenosa [0 (0,0%) vs. 7 (20,6%); p = 0,013]
Conclusión	Los pacientes de edad avanzada mostraron tasas particularmente más altas de colecistitis aguda y gangrenosa durante la pandemia. La colecistectomía laparoscópica se puede realizar de forma segura en la

	era COVID-19 sin impacto negativo en los resultados perioperatorios. Por lo tanto, asumiríamos que la colecistectomía laparoscópica puede recomendarse a cualquier paciente con colecistitis aguda, incluidos los ancianos.
--	---

Tabla 18. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°14

Título	Conversión de colecistectomía laparoscópica a abierta: análisis de factores de riesgo con base en parámetros clínicos, de laboratorio y de ultrasonido
Autores	J. Morales-Maza, J.H. Rodríguez-Quintero, O. Santes et al.
Año	2020
Objetivo	La identificación de factores de riesgo por la conversión en el contexto de colecistitis aguda permitirá individualizar el cuidado del paciente y mejorar los resultados.
Metodología	se utilizó un enfoque cuantitativo retrospectivo
Resultados	El estudio incluyó a 321 pacientes con colecistitis aguda. La edad promedio fue de 49 años \sim (DE: ± 16.8). El 65% fueron del sexo femenino y el 35% del sexo masculino. Treinta y nueve casos (12.14%) se convirtieron a cirugía abierta. En el análisis univariado, la mayor edad, el sexo masculino, el grosor de pared vesicular y el líquido pericolecístico se asociaron con un mayor riesgo de

	<p>conversión. En el análisis multivariado, todas las variables con excepción del líquido pericolecístico mantuvieron asociación con conversión. Nuestro modelo de predicción de riesgo demostró una sensibilidad del 84%.</p>
Conclusión	<p>Es posible utilizar datos clínicos preoperatorios para identificar a pacientes que tienen un mayor riesgo de conversión a cirugía abierta. Conocer dichos factores puede mejorar la planeación del plan quirúrgico y estar preparados para casos desafiantes</p>

Tabla 19. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°15

Título	<p>Efecto de la enfermería sistemática sobre la respuesta al estrés y la recuperación de la función gastrointestinal en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica</p>
Autores	<p>shali , jing bai, Wanxia Wei, Xiaoqin Liu, Yanping Shen</p>
Año	<p>2021</p>
Objetivo	<p>explorar el efecto de la enfermería sistemática sobre la respuesta al estrés y la recuperación de la función gastrointestinal en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica.</p>
Metodología	<p>Se realizó un estudio retrospectivo entre 102 pacientes con enfermedad del sistema vesicular.</p>

Resultados	En comparación con el grupo de control, el tiempo para levantarse de la cama por primera vez después de la operación, el tiempo de recuperación de los ruidos intestinales y el tiempo de los primeros gases/defecación después de la operación en el grupo de observación fueron significativamente más tempranos (todos $P < 0,01$), y la estancia hospitalaria fue significativamente más corta ($P < 0,001$). En comparación con 12 horas antes de la operación, los niveles séricos de adrenalina y cortisol de los dos grupos fueron significativamente más altos 48 horas después de la operación, y los niveles en el grupo de observación fueron más bajos que los del grupo de control (todos $P < 0,001$).
Conclusión	La atención sistemática durante el período perioperatorio de la colecistectomía laparoscópica puede aliviar el grado de estrés, promover la recuperación de la función gastrointestinal posoperatoria, aliviar el nivel de ansiedad y depresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes después del alta hospitalaria.

Tabla 20. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°16

Título	Efectos de la enfermería individualizada basada en la teoría del defecto cero en pacientes perioperatorios sometidos a colecistectomía laparoscópica
Autores	Li Hong Lan ,Autor correspondiente Xiaozheng Zhu , Bili Ye , Huizhen Jiang ,y Yuntao Huang

Año	2022
Objetivo	Analizar los efectos de la enfermería individualizada basada en la teoría del defecto cero en pacientes perioperatorios sometidos a colecistectomía laparoscópica.
Metodología	Estudio cualitativo
Resultados	Las puntuaciones de depresión y ansiedad de los dos grupos después de amamantar disminuyeron, y la disminución en el grupo de observación fue significativamente mayor que en el grupo de control. El tiempo transcurrido hasta el primer escape posoperatorio, el retorno a la ingesta normal, la actividad fuera de la cama y la estancia hospitalaria en el grupo de observación fue menor que en el grupo de control. La incidencia de complicaciones postoperatorias en el grupo de observación fue sustancialmente menor que en el grupo de control. El grado de satisfacción de los cuidados de enfermería en el grupo de observación fue significativamente mayor que en el grupo de control.
Conclusión	La atención de enfermería individualizada basada en la teoría del defecto cero puede reducir eficazmente la respuesta al estrés psicológico perioperatorio de los pacientes con colecistectomía laparoscópica. Ayuda a mejorar las emociones negativas de la depresión y la ansiedad, promueve la recuperación de la enfermedad,

	reduce las complicaciones postoperatorias y mejora la satisfacción de la enfermería, lo cual es digno de promoción clínica.
--	---

Tabla 21. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°17

Título **Efecto de la atención de enfermería integral de alta calidad sobre las complicaciones posoperatorias, el grado de dolor y la satisfacción de enfermería en pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.**

Autores	Liuyuan Wei , * Qiao Hong , * Xiaomei Lin , Yuyan Chen , 3Fan Yang , Fen Li , y Yulin Chen
Año	2021
Objetivo	Investigar la influencia de la atención de enfermería integral de alta calidad sobre las complicaciones posoperatorias, el grado de dolor y la satisfacción de enfermería en pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.
Metodología	se realiza el trabajo de experimental
Resultados	Después de una intervención de enfermería integral de alta calidad, el tiempo hasta el primer flato, el tiempo hasta la primera defecación, el tiempo hasta la primera actividad fuera de la cama y la estancia hospitalaria en el grupo experimental fueron significativamente más cortos que en el grupo de control después de la cirugía (P <0,05).). El número de complicaciones postoperatorias en el grupo experimental

	<p>fue notablemente menor que en el grupo de control (P <0,05). Después de la intervención, las puntuaciones del grado de dolor en el grupo experimental fueron más bajas que las del grupo de control (P <0,05). Después de la intervención, las puntuaciones de satisfacción de enfermería en el grupo experimental fueron mayores que las del grupo de control (P <0,05).</p>
Conclusión	<p>La enfermería integral de alta calidad puede mejorar la incidencia de complicaciones posoperatorias, el grado de dolor, la satisfacción de la enfermería y la calidad de vida de los pacientes con cálculos biliares durante el período perioperatorio.</p>

Tabla 22. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°18

Título	Atención de enfermería durante la perioperatoria dentro del contexto quirúrgico
Autores	Ángela María Salazar Maya
Año	2022
Objetivo	Evaluar la atención de enfermería durante la perioperatoria dentro del contexto quirúrgico
Metodología	Tipo descriptivo
Resultados	El postoperatorio depende del tipo de anestesia y procedimiento quirúrgico, enfatizando la permeabilidad de las vías respiratorias, la estabilidad hemodinámica, el dolor, y sintomatología presentada por

	los pacientes hasta que sean estables y adecuados para su transferencia a otro servicio o su hogar
Conclusión	Los pacientes transitan de la preoperatoria a la postoperatoria, lo que los pone en riesgo de eventos adversos; por lo tanto, dentro de este contexto, la seguridad del paciente está presente en cada atención brindada. Por lo tanto, la enfermería debe conocer los detalles en la atención para que el paso de los pacientes a través de este contexto sea lo más beneficioso posible.

Tabla 23. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°19

Título	Evaluación del protocolo de cuidados de calentamiento posoperatorio para el confort térmico y el control de la temperatura inmediatamente después de la cirugía: ensayo controlado no aleatorizado
Autores	Norihiro Kameda , Shinobu Okada
Año	2022
Objetivo	determinar los efectos de un protocolo de cuidado de calentamiento (WCM) sobre el control de la temperatura y la percepción del confort térmico en hipotermia después de una cirugía abdominal mayor.
Metodología	enfoque cuantitativo

Resultados	La diferencia de temperatura, calculada como la diferencia entre la temperatura central y la de la piel, fue similar entre los grupos de control y de intervención al final de la cirugía. Sin embargo, la diferencia de temperatura en el grupo de intervención disminuyó dentro de las 3 horas posteriores a la llegada a la sala y se mantuvo más baja que en el grupo de control. La puntuación de la escala analógica visual para el malestar térmico posoperatorio fue significativamente menor en el grupo de intervención que en el grupo de control, lo que indica que se logró una mayor comodidad con la intervención de calentamiento.
Conclusión	Los pacientes fueron calentados utilizando métodos de calentamiento activo bajo el WCM, lo que a su vez aumentó la percepción de confort térmico con la temperatura corporal. Los pacientes posoperatorios a menudo requieren cuidados cálidos para lograr comodidad térmica, lo que puede mejorar mediante una observación y un tratamiento adecuados dentro de 1 a 2 horas después de la operación. Nuestros resultados indican que las enfermeras podrían calentar eficazmente al paciente para mantener la temperatura corporal normal después de la cirugía, no sólo para mejorar el confort térmico, sino también para prevenir escalofríos y posiblemente diversas complicaciones postoperatorias.

Tabla 24. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°20

Título	Manual de cuidados de enfermería al paciente pre y postoperatorio de colecistectomía: elaboración y evaluación.
Autores	Ramos, Francine Carpes , Piexak, Diéssica Roggia , Rocha, Laurelize Pereira , Barros, Edaiane Joana Lima , Castanheira, Janaína Sena
Año	2021
Objetivo	elaborar y evaluar un manual de cuidados de enfermería para pacientes en el pre y postoperatorio de colecistectomía
Metodología	Enfoque cualitativo, descriptivo
Resultados	de manera unánime, los participantes creen que la información contenida en el manual es importante, además de que la forma en que está ordenada la información es adecuada y las ilustraciones contribuyen a una mejor comprensión del texto
Conclusión	el uso del manual es válido cuando fomenta la educación en salud; muestra los cuidados/procedimientos a realizar y proporciona bienestar.

Tabla 25. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°21

Título	Colecistectomía laparoscópica cuidados postoperatorios
Autores	Chacha, N; Campoverde, J; García, M; Holguín, L; Vallejo, P; Zavala, N
Año	2018
Objetivo	Determinar la colecistectomía laparoscópica cuidados postoperatorios
Metodología	Descriptivo, método de tipo inductivo
Resultados	una vez diagnosticada la inflamación, el médico tratante recomienda la intervención quirúrgica para remover la vesícula biliar usando un dispositivo médico llamado laparoscopia, durante dicho proceso se realizan entre uno o cuatro pequeñas incisiones en el abdomen procedimiento llamado colecistectomía
Conclusión	En consecuencia, una vez que el paciente es dado de alta, debe cumplir una serie de recomendaciones postoperatorias entre las cuales se encuentran: comer bajo en grasa, ingerir analgésicos o antiinflamatorios para reducir los efectos del dolor, evitar la realización de movimientos para ayudar a la herida a una cicatrización entre otros.

Tabla 26. Ficha Bibliográfica del Artículo de revisión N°22

Título	Papel de la enfermería en pacientes postoperados y la necesidad de adquirir nuevos conocimientos
Autores	Tavera, R; Hernández, C; Alonso, O
Año	2021
Objetivo	especificar los procedimientos que debe cumplir a cabalidad enfermería en pacientes postoperados.
Metodología	revisión bibliográfica tipos retrospectiva
Resultados	Se pudo verificar mediante estudios que parte del personal de enfermería aún tiene bajos conocimientos sobre el manejo de estos pacientes tanto en el área de quirófano hasta el área de hospitalización.
Conclusión	Ayudará a reforzar y complementar las nociones teóricas sobre el tema investigativo.