

## RESUMEN

**Objetivo:** Comparar la higiene oral y las características epidemiológicas de la enfermedad periodontal entre mujeres que se encuentren en etapa de gestación y mujeres que se encuentran en periodo de lactancia de una comunidad urbano marginal de Lima-Perú en el 2014. **Materiales y Métodos:** Cuarenta mujeres agrupadas según el trimestre de gestación y cuarenta mujeres agrupadas según el bimestre de lactancia, fueron evaluadas empleando el índice de higiene oral simplificado, índice periodontal comunitario y el índice de pérdida de fijación. **Resultados:** Se realizó las pruebas estadísticas chi cuadrado y test exacto de Fisher para comparar ambos grupos. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre gestantes y lactantes al comparar la higiene oral, el sangrado al sondaje y la pérdida de fijación. Sin embargo se halló diferencias estadísticamente significativas con respecto a las bolsas periodontales, siendo más prevalentes en gestantes. Además es importante mencionar que las bolsas periodontales disminuyeron progresivamente a medida que avanzaban los trimestres de lactancia. **Conclusión:** Durante el embarazo se presentan más características epidemiológicas de enfermedad periodontal que en el periodo de lactancia materna y no hay variación en la higiene oral.

**PALABRAS CLAVE:** Embarazo, Lactancia Materna, Enfermedades Periodontales.