

RESUMEN

Objetivos: El propósito de este estudio fue conocer el estado periodontal y el hábito de fumar en estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2014. **Materiales y Métodos:** Esta investigación fue de carácter descriptivo, observacional y se realizó en una secuencia transversal con resultados cuantitativos y cualitativos. Para lograr esto, todos los estudiantes que participaron, firmaron un consentimiento informado dónde se les explicaba la intención de esta investigación, y luego se procedía a realizar una encuesta para obtener datos de los estudiantes como sexo, edad, año de estudios, si es fumador o no y edad en la que comenzó a fumar. Seguido de esto se evaluaba a cada participante con una sonda periodontal recomendada por la OMS y se realizaba el índice periodontal comunitario (IPC), donde se registró la presencia o ausencia de sangrado y bolsas periodontales de todas las piezas dentarias en boca. **Resultados:** Según la encuesta formulada y el índice periodontal comunitario, la edad promedio en el inicio del hábito de fumar fue a los 16.3 años de edad, en donde 59 estudiantes, de los 162 evaluados, respondieron que sí fumaban. y estos fumadores mostraban mayor sangrado al sondaje Los estudiantes de segundo año junto con los de tercer año presentaron un mayor sangrado al sondaje. También, mientras más temprano se inicie el hábito de fumar, mayores probabilidades de tener bolsas periodontales. **Conclusiones:** No se han encontrado signos clínicos de enfermedad periodontal en la población estudiada.

PALABRAS CLAVE: Tabaco, Enfermedades Periodontales, Salud Bucal, Hábito de Fumar.