

RESUMEN

Objetivos: Describir la estructura de la sintomatología psiquiátrica evaluada mediante el SRQ-18 en pacientes ambulatorios con trastornos mentales de un hospital general de Lima.

Métodos: Se utilizó un registro de información con datos demográficos y clínicos de pacientes de consultorio externo de psiquiatría del Hospital Cayetano Heredia (Lima, Perú). Utilizando la información de 210 pacientes, se exploraron los vínculos entre síntomas psiquiátricos del cuestionario SRQ-18 mediante correlaciones tetracóricas graficadas a través redes generadas con el programa NodeXL. **Resultados:** Los ítems más fuertemente correlacionados fueron los referidos al consumo de alcohol, que forman un conglomerado vinculado con el resto de síntomas psiquiátricos a través del ítem sobre ideas suicidas. Otros conglomerados que se evidencian representan a la depresión (anhedonia, pérdida del interés, tristeza, llanto, dificultades para trabajar, ideas de inutilidad, aburrimiento, ideas suicidas, cansancio e indecisión; siendo los 3 primeros los principales), la ansiedad (nerviosismo/tensión, asustarse), los síntomas físicos (dormir mal, mal apetito y mala digestión) y la psicosis (pensamiento raro, pseudopercepciones auditivas). Asimismo, se encuentra una fuerte interconexión entre los síntomas depresivos, ansiosos y físicos.

Conclusiones: Se evidencian 5 conglomerados de síntomas correspondientes a los síndromes: problemas con el alcohol, depresión, ansiedad, síntomas físicos y psicosis.

PALABRAS CLAVES: Síndromes psiquiátricos, síntomas psiquiátricos, nosología.