

**EFICACIA DE LA CORRIENTE DE ELECTROESTIMULACION NERVIOSA
TRANSCUTANEA CONVENCIONAL EN EL ALIVIO DEL DOLOR
FANTASMA DEL MIEMBRO INFERIOR**

CONVENTIONAL TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION
EFFECTIVENESS ON THE LOWER LIMB PHANTOM PAIN RELIEF

Autores

Álvarez Limaylla Yosseline Estefany¹, Silva Cabrera Martin Ricardo
Carlos², Tipacti Correa Iveth Jimeba^{1,3},

Asesores

Mormontoy Laurel Wilfredo⁴, Carpio Barrio de Mendoza Cecilia Luisa⁵.

¹ Licenciada en Terapia Física, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

² Interno en Terapia Física, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

³ Centro de Rehabilitación Neurológica (CERENE).

⁴ DR. Profesor del departamento de estadística, demografía, humanidades y ciencias sociales de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú (Asesor)

⁵ Licenciada en Terapia Física, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (Asesora)

El presente trabajo de investigación obtuvo la recolección de datos de las historias clínicas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.