

## RESUMEN

Objetivo: Comparar el impacto de las condiciones orales sobre la calidad de vida en los escolares del sector urbano y rural del Cantón Cañar Ecuador. Método: diseño de corte transversal. Se utilizó una versión en español validada en Perú del Child-OIDP Index para determinar el impacto de 17 condiciones bucales en 8 desempeños o actividades diarias. Resultados: se determinó que: el 74.1% de escolares refirieron uno ó más de un desempeño impactado. El promedio de condiciones orales auto-percibidas como problema fue de  $1.92 \pm 1.35$ . Las condiciones más frecuentemente señaladas como problema fueron: Diente cariado (45.3%) Dolor de muela (31.8%), Forma o tamaño de los dientes (22.9%), Color de dientes y Erupción de dientes permanentes (15.3%). La severidad del impacto de las condiciones orales sobre los desempeños fue grave, los ocho desempeños tuvieron un puntaje promedio de  $5.64 \pm 6.17$ , y el desempeño con mayor severidad de impacto fue Comer ( $2.29 \pm 3.22$ ). El 65.29 % de escolares calificaron a los impactos como de poca o muy poca intensidad, no manifestaron intensidad severa ni muy severa. La extensión de desempeños impactados fue  $1.14 \pm 0.91$ . Según sexo y lugar de procedencia, se encontró diferencia estadísticamente significativa de (0.001 y 0.048 respectivamente), en la zona urbana se encontró diferencia significativa con relación al sexo de (0.011), no así en la zona rural. Conclusión: se concluye que las condiciones orales en relación a la calidad de vida están asociadas a la zona urbana y al sexo de los escolares del Cantón Cañar.

**Palabras Clave:** Calidad de vida relacionada a la salud, (CVRS), salud oral, escolares, urbano y rural.