

RESUMEN

El objetivo del estudio es describir las características epidemiológicas y clínicas de la Brucelosis humana en pacientes con diagnóstico positivo en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el periodo 2007-2014. Se revisaron 68 historias clínicas con un diagnóstico positivo a Brucelosis por *B. melitensis*. El mayor número de casos se dio en el año 2007 con 28 casos (41,1%). La mayoría de pacientes fueron personas del sexo femenino (58,8%) y procedentes del distrito del Callao (75,0%). Además, las ocupaciones con un mayor número de casos fueron: estudiante (34,5%) y ama de casa (29,3%). Los signos clínicos mayormente reportados fueron fiebre (83,8%), cefalea (57,4%) y síntomas articulares (55,9%). La prueba de laboratorio más solicitada fue Rosa de Bengala. Adicionalmente para complementar y actualizar información se realizaron entrevistas a 22 ex pacientes. La mayoría indicó que consumió leche o queso de cabra (81,8%), desconocían la enfermedad (77,3%) y habían ingerido platos con ingredientes lácteos de caprinos (45,5%). El producto fue mayormente adquirido por venta ambulatoria (40,9%) y puestos de mercado (27,3%). El signo clínico de alarma fue fiebre (86,4%) y dolor articular (63,6%). El 81,8% acudió a un hospital para atenderse. El tiempo de tratamiento fue 1 mes en 8 ex pacientes (36,4 %) y 2 meses en 6 ex pacientes (27,3%). El tratamiento fue financiado por el SIS (Seguro Integral de Salud) en 13 pacientes (59,1%). Los resultados indican que la enfermedad aún se encuentra presente en nuestro medio y refleja la situación epidemiológica de la enfermedad en animales. Por lo tanto, es necesario un control más eficiente de la vacunación a todos los animales para prevenir la enfermedad en la población.

Palabras claves: Brucelosis, Callao, zoonosis.